



僅供外用
控油抗屑 健康頭皮

皮屑芽孢菌(Pityrosporum)，是一種寄生於人體皮膚表面上的酵母菌，是造成脂漏性皮膚炎、頭皮屑及頭皮癢的主要原因。本洗髮精含1%抗黴菌劑Ketoconazole(克多可那挫)，能有效抗屑、止癢，治療皮屑芽孢菌過度繁殖引起的不同感染症狀。弱酸性pH值溫和親膚配方，無矽靈，不殘留；另添加深層控油成份，能去除頭皮多餘油脂，健康調理頭皮，男女均適用。

【成份】

每一公克含有10毫克有效抗黴菌成份ketoconazole，及具控油效果的Fucus Vesiculosus Extract。

賦形劑：Sodium Laureth Sulfate、Lauramidopropyl Betaine、Edetate Disodium、Polyquaternium-10、Methyl Parahydroxybenzoate、Propyl Parahydroxybenzoate、Citric Acid、Cocamide Diethanolamine、2-Phenoxyethanol、Methylisothiazolinone、Polyquaternium-7、Laminaria Saccharina Extract、Fragrance、CI 17200、SUNSET YELLOW FCF CI 15985、Sodium Chloride、Purified Water

【性質】

藥效學

Ketoconazole是合成性imidazole dioxolane衍生物，具有強效的抗黴菌作用，能對抗皮癬菌(dermatophytes)，如髮癬菌屬(Trichophyton spp.)、表皮癬菌屬(Epidermophyton spp.)、小芽孢菌屬(Microsporum spp.)和酵母菌(yeasts)，如念珠菌(Candida spp.)、糠秕疹小芽孢菌(Malassezia spp.)、皮屑芽孢菌(Pityrosporum ovales)。萌髮®康力諾1%抗屑洗髮精可以緩解因上述感染所引起的頭鱗屑剝落。

藥物動力學

Ketoconazole洗髮精幾乎不會經皮膚吸收，使用後測不到Ketoconazole的血中濃度，因此不會發生全身性作用。

臨床前安全性試驗

根據臨床前安全性試驗的研究結果顯示，Ketoconazole洗髮精可能會造成的影響包括急性口腔或皮膚不良反應、眼部刺激及重複劑量下的皮膚刺激及不良反應。

【適應症】

減少因黴菌感染所引起的頭皮屑治療之輔助劑。

【用法與用量】

每週使用2次，兩次間隔至少3天，每次用量約掌心容量即可，使用於皮膚或頭皮的感染部位，按摩3至5分鐘後再以清水洗淨。依個人髮質不同，可視個人需要在髮尾使用潤髮或護髮產品，但應避免使用於頭皮，以利療效。

簡單抗屑三步驟：

- 1.清潔：取適量的洗髮精於手掌中，依正常洗髮程序輕柔清洗頭髮，並用指腹按摩頭皮。
- 2.停留：洗髮時，讓洗髮精停留在頭皮上3分鐘(可視情況嚴重程度延至15分鐘)。
- 3.沖淨：以清水徹底沖洗乾淨。

【懷孕及授乳】

Ketoconazole 1%在局部使用後不會經由皮膚吸收。雖然目前沒有使用於懷孕及授乳婦女的臨床試驗能佐證Ketoconazole的安全性，但至今並無孕婦或哺乳婦女使用Ketoconazole 1%後，發生任何相關風險問題的個案情況。若仍有疑問，請諮詢您的藥師或專科醫師。

【禁忌症】

已知對Ketoconazole過敏及其它任何成份過敏的患者不要使用。

【副作用】

安全性的臨床試驗顯示，最常見的副作用($\geq 1\%$)包括使用部位搔癢、髮質變化。常見的副作用(<1%)包括眼睛部位異常反應(結膜炎、眼睛刺激敏感)、使用部位異常反應(禿頭、乾燥、膿胞、紅疹、刺激、敏感、毛囊炎、局部反應、壓痛)、皮膚或皮下組織異常反應(面皰、髮色改變、皮膚灼熱感、脫皮)。根據產品上市後安全監測的結果顯示，僅有十分罕見的副作用發生，包括過敏症、血管性水腫、接觸性皮膚炎、全身紅疹與蕁麻疹。

【過量使用】

若意外吞食時，請就醫。為了避免吸入，請勿催吐或洗胃。

【警語注意事項】

1. 長期使用腎上腺皮脂類固醇治療的患者，為了預防停藥後的反彈作用，建議採漸進式的停藥方式。
 - 在開始使用萌髮®康力諾1%抗屑洗髮精的第一個星期，繼續使用原有腎上腺皮脂類固醇藥物；
 - 接下來的第二至三個星期，再逐漸減少使用原有的腎上腺皮脂類固醇藥物的次數；
 - 最後完全停止使用原有的腎上腺皮脂類固醇藥物。
2. 須置放於兒童無法拿取之處。
3. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦女不建議自行使用。
5. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
6. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
7. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
8. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
9. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
10. 塗抹皮膚外用藥後，應徹底洗淨雙手再戴隱形眼鏡。
11. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
12. 徵菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
13. 如同其他洗髮精一樣，要避免接觸到眼睛。若洗髮精流入眼中，請以清水沖洗眼睛。

【容量】

1000公克以下塑膠瓶裝、塑膠軟管裝、鋁箔盒裝。

【儲存方式】

請旋緊瓶蓋並保存於25°C以下，並避免陽光照射處。請置於兒童無法拿取之處。

製造批號、有效期限請參考外盒或瓶身

本註冊商標由耐斯企業股份有限公司授權 正和製藥股份有限公司新營廠製造
衛署藥製字第042013號

藥商、製造廠：正和製藥股份有限公司新營廠

住址：臺南市新營區新工路23號

經銷商：耐斯企業股份有限公司

地址：台灣嘉義縣民雄工業區中山路21號

網址：<http://www.freshup.com.tw>

消費者服務專線：0800-211-226

醫師藥師藥劑生指示藥品